

ANTES DE USAR ESTE PRODUTO LEIA CUIDADOSAMENTE O ROTULO

PERFECTO

PERFECTO

PERFECTO

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Perigoso se ingerido.
 Nocivo em contacto com a pele.
 Tóxico se inalado.
 Muito toxico para a vida aquática com efeitos de longa duração.
 Guarde todos os pesticidas separados de outros produtos num armazém próprio fechado a chave.
 Nunca utilize as embalagens vazias para guardar água e alimentos.
 Evite respirar os produtos pulverizados.
 Não aplique contra o vento nem com vento forte.
 Tire e lave a roupa protectora no fim do trabalho.
 Faça a tripla lavagem das embalagens vazias e depois fure-as, destrua-as e enterre em local seguro e longe de fontes de água.

SINTOMAS DE ALARME:

Não há sintomas específicos conhecidos de envenenamento.


PRIMEIROS SOCORROS:

OLHOS; Em caso de respingos nos olhos, enxágue por 15 minutos com água limpa, mantendo as pálpebras abertas.
 PELE: Em caso de contato com a pele, remova todas as roupas contaminadas e lave a pele com água e sabão em abundância.
 INGESTÃO: Em caso de ingestão, não induzir ao vômito, administrar suspensão de carvão ativado e a seguir soro purgante (30 g de sulfato de sódio). Nunca administre nada pela boca ou induza o vômito a uma pessoa inconsciente.
 INALAÇÃO: Se for inalado, remova o paciente do local de exposição e, se necessário, aplique respiração artificial. Em todos os casos, procure assistência médica.

ANTÍDOTO E TRATAMENTO

(Informações para medico):

Aplique tratamento sintomático.



SUBSTANCIA ACTIVA


Imidacloprid 125g/litro +
 Lambdacyhalothrin 50 g/litro

Inseticida de amplo espectro para o controle de pragas sugadoras e picadoras de algodão, milho, castanha de caju, campo e hortaliças.

Concentrado de suspensão (SC)

Nº REGISTO:

VOLUME NETO:



MANTER AFASTADO DAS CRIANÇAS

Nº Lote:
 Data de Fabrico:
 Usar antes de:
 Agente:

Fabricante:

AGROLANDIA
 Rua Estevao Ataide no 20
 Sommershield
 Tel : + 258 21 498 617
 Mail : agrolandiamoz@gmail.com
 Maputo - Mocambique

DVA AgroGmbH
 Valentinskamp 70 Emporio Tower
 20355 - Hamburg
 Alemanha

INSTRUÇÕES DE USO:

ANTES DE USAR ESTE PRODUTO LEIA AS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA INDICADAS

INSTRUÇÕES DE USO:

Inspeccione sua plantação regularmente e pulverize Imidacloprid+Lambdacyhalothrin ao primeiro sinal de infestação de pragas. O tratamento pode ser repetido conforme necessário, dependendo da pressão do inseto. Consulte um local especialista para aconselhamento adicional em qualquer caso particular.

COLHEITA	PRAGA	TAXA DE APLICAÇÃO	INDICAÇÕES PARA PULVERIZADORES	TEMPO DE APLICAÇÃO
ALGODÃO	Bollworms, pulgões, Leaf worms, strainers, pragas sugadoras	400 ml em 120 litros de água por ha	65 ml em 15 litros de água	Pulverize logo após o início da floração. Repita a cada 2 semanas, conforme necessário.
CULTURAS DE MILHO, CAMPO E VEGETAIS	pragas sugadoras	150-400 ml em 120 litros de água per ha.	25-65 ml em 15 litros de água.	Pulverize ao primeiro sinal de praga e repita conforme necessário.

PRÉ-COLHEITA: PREPARAÇÃO DA CALDA:

Use a taxa de aplicação indicada como pulverização foliar direcionada quando a população de pragas começar a crescer. Assegure uma cobertura completa e uniforme para o melhor controle da praga e melhores resultados. Usar volumes adequados e equipamento de aplicação devidamente calibrado para evitar escoamento. Aplique Imidacloprid + lambdacyhalothrin via equipamento de aplicação terrestre ou aérea. Repita a aplicação, se necessário e escute regularmente. Aplicação no solo: Use equipamentos de aplicação no solo fornecidos com bicos que criam gotículas de tamanho médio. Isso focalizará adequadamente o aplicativo e evitará desvios. Um surfactante já está incluso no produto formulado para a otimização desta aplicação. Misture completamente Imidacloprid + Lambdacyhalothrin com água limpa. Mistura insuficiente pode resultar em desempenho. Encha o tanque de mistura até ¼ aprox. com água e em seguida adicione a quantidade desejada de Imidacloprid + lambdacyhalothrin. Encha até a quantidade necessária de água. Certifique-se de que a mistura está bem agitada e aplique logo em seguida. Mantenha a agitação durante a pulverização - não permita que fique parado.

COMPATIBILIDADE:

Pode ser misturado e aplicado junto com uma série de outros produtos fitofarmacêuticos que têm modos e tempos de aplicação semelhantes. Verifique sempre o Imidacloprid+Lambdacyhalothrin compatibilidade deste produto com qualquer outro inseticida, herbicida, fungicida, crescimento de plantas regulador ou fertilizante e consulte um especialista local, se necessário

NATUREZA DO RISCO:

O fabricante declina qualquer responsabilidade por danos que possam ocorrer devido ao armazenamento ou uso indevido do produto.

