

## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Este pesticida envenena através da pele.
- Evite qualquer contacto do produto. Use equipamento de protecção como fato macaco, botas de borracha, luvas, máscara própria com filtros novos.
- Não beber, comer ou fumar durante a utilização deste produto.
- Não desentupir os bicos com a boca.
- Perigoso para animais, peixes e abelha.
- Não contaminar com restos de produto a água dos poços e rios.
- Lave o equipamento longe das fontes de água.
- Guarde todos os pesticidas separados de outros produtos num armazém próprio fechado a chave.
- Nunca utilize as embalagens vazias para guardar água e alimentos.
- Evite respirar os produtos pulverizados.
- Não aplique contra o vento nem com vento forte.
- Tire e lave a roupa protectora no fim do trabalho. Nunca a leve para casa.

## SINTOMAS DE ALARME:

Fraqueza, apatia, dificuldade respiratoria, tremores.

## PRIMEIROS SOCORROS:

No caso de contacto do produto com a pele, lave imediatamente com muita água, tire a roupa se estiver suja com pesticida.

Se o produto atingir os olhos, lave-os imediatamente com muita água durante 10 minutos.

Se o produto for engolido não provoque o vomito.

Em caso de envenenamento chame o medico e mostre-lhe este rotulo.

## ANTÍDOTO E TRATAMENTO:

(Informações para medico):

Não existe antídoto específico. Aplicar Tratamento sintomático.

## INSTRUÇÕES DE USO:

### ANTES DE USAR ESTE PRODUTO LEIA AS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA INDICADAS

CULTURA/PRAGA	DOSE	I.S	OBSERVACAO
Citrinos Excluído Kumquat Afídeos, cochonilha vermelha e Psylla	Tratamento do solo 9ml/arvore	212 dias	Deve ser aplicado no início da infestação
Afídeo preto	6ml/planta		
Citrinos-Viveiro Afídeo preto, Minadores de folha	1,5ml/covacho	N/A	Aplique em 200ml de água 2 dias depois do transplante dos garfos nos sacos plásticos.
Tripos	3ml/covacho		
Citrinos Minadora de citrinos		7 dias	Deve ser aplicado no início de infestação

## MANTER AFASTADO DAS CRIANÇAS



# RAPOSA™ 350 SC

INSECTICIDA

N.º registo: DSV - 1597

Substância activa: IMIDACLOPRID 350 g/l  
SUSPENSÃO CONCENTRADA (SC)

**Insecticida sistémico para o controlo de diversas pragas nas culturas mencionadas.**

Volume Neto

1litr



**DVA**  
GO FURTHER. TOGETHER

N.º Lote:

Data de Fabrico:

Usar antes de:

**Fabricante:**

DVA Agro GmbH  
Valentinskamp 70  
D 20355 - Hamburg  
Alemanha

**Agente:**  
AGROLÁNDIA  
Rua Estevão Atáside no 20  
Sommershield  
Tel : + 258 21 498 617  
Mail: agrolandiamoz@gmail.com  
Maputo - Mocimboa

CULTURA/PRAGA	DOSE	I.S	OBSERVACAO
Maça Afídeos	Aplicação no solo: arvoredos com mais de 6 anos : 3ml/arvore	70 dias	Aplique 3 semanas depois da floração. Aplique em 1l de água directamente no solo em volta da base. Regar 24 horas depois da aplicação.
Batata- Afídeos	Aplicação foliar: 60ml/100ml de água (1,5-2,1 l/ha em 2500-3000 litros de água/ha)	120 dias	Aplique em cobertura completa e alto volume a partir de Dezembro.
Gorgulho Lagarta branca Lagarta alambre Pulgão verde da batata, Pulgão verde do pessegueo	3-4,5 ml/100m de linha 100cm 3/ha 250cm 3/ha	120 dias	Deve ser aplicado no início da infestação
Cravo.Cochonilha Crisatem-Pinnapis spp Gladiol Ornamentais Roças	1-1,5l/ha 35-60 cm 3/10 lt de água ou 30-50cm 3/ha	N/A	Deve ser aplicado no início da infestação
Repolho Pulgão da couve	30-50cm 3/ha	7 dias	Deve ser aplicado no início da infestação.
Pessegueo Pulgão verde do pessegueo	30-50cm 3/ha+ 0,2% de adjuvante	14 dias	Deve ser aplicado no início da infestação.
Alface/Tomate Minadora das folhas Tripos	1-1,5 l/ha	7 dias	Deve ser aplicado no início da infestação.
Pulgão do alface	1-1,5 /ha		
Pepino Minadora das folhas	1,5-2 l/ha ou 35-60 cm 3/10lt de água	3 dias	Deve ser aplicado no início da infestação
Pmentão Mosca branca, Pulgão verde das solanáceas, Pulgão vermelho	1-2 l/ha ou 35-60 cm 3/ha	3 dias	Deve ser aplicado no início da infestação

